

gebe

by Mustapa Mustapa

Submission date: 08-Nov-2021 10:12AM (UTC+0900)

Submission ID: 1560704874

File name: turnitin_gabena.docx (200.6K)

Word count: 1943

Character count: 12799

Effect of Tween Concentration 80 as Edge Activator on Characteristics and Rate of Difusion of Sodium Diclofenac Transfersome

ABSTRAK

Natrium diklofenak adalah obat antiinflamasi non steroid yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase. Transfersom adalah sistem penghantaran transdermal yang terdiri dari fosfolipid dan *edge activator*, meningkatkan ukuran pori-pori lipid *barrier* stratum korneum masuk kedalam kulit melalui dorongan gerakan *transbarrier* dan memeras diri mengikuti ukuran pori lipid *barrier*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi tween-80 sebagai *edge activator* terhadap karakteristik dan laju difusi transfersom natrium diklofenak. Preparasi transfersom menggunakan metode vorteks-sonikasi yang dibuat dalam 5 formula dengan variasi perbandingan konsentrasi fosfatidilkolin dan tween-80 (95:05, 90:10, 85:15, 80:20, dan 75:25). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke-5 formula memiliki bentuk morfologi yang berbeda. Dari hasil uji statistik menggunakan *One-Way ANOVA* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna (p value 0.01) dari konsentrasi *edge-activator* terhadap laju difusi transfersom natrium diklofenak.

Kata Kunci:

Transfersom, Natrium Diklofenak, *Edge Activator*, Transdermal

Diterima:

Disetujui:

Online:

ABSTRACT

Diclofenac sodium is a Transfersom is a transdermal delivery system consisting of phospholipids and edge activators. Transfersom increases the size of the stratum corneum lipid barrier pores, then enters the skin through the drive of the trans-barrier motion and squeezes itself to follow the lipid barrier pore size. The purpose of this study is to determine the effect of the tween-80 concentration as an edge activator on the characteristics and diffusion rate of diclofenac sodium transfersom. Transferom preparation used the vortex-sonication method which was made in five formulae with variations in the concentration ratio of phosphatidylcholine and tween-80 (95:05, 90:10, 85:15, 80:20, and 75:25). The results show that all five formulae have different morphological forms. The results of statistical tests using *One-Way ANOVA* finds a significant effect (p-value) of the edge activator concentration on the diffusion rate of diclofenac sodium transfersom.

Copyright © 2019 Jsscr. All rights reserved.

Keywords:

Transfersomes, Diclofenac Sodium, *Edge Activator*, Transdermal

Received:

Accepted:

Online:

1. Pendahuluan

Inflamasi merupakan gangguan pada membran sel yang menyebabkan fosfolipid mengeluarkan asam arakidonat dengan bantuan enzim fosfolipase kemudian diubah menjadi mediator-mediator nyeri. Natrium diklofenak adalah antiinflamasi non steroid yang bekerja dengan cara menghambat enzim Sikooksigenase-2 yang dapat berubah menjadi mediator inflamasi. Pemberian natrium diklofenak secara oral dapat menyebabkan efek samping terhadap gastrointestinal dan kardiovaskular. Selain itu, lima puluh persen (50%) diklofenak dosis oral tidak mencapai sirkulasi sistemik karena efek metabolisme lintas pertama. Natrium diklofenak akan diperburuk proses absorpsinya oleh makanan. Ikatan protein 99,7% sehingga kurangnya jumlah obat bebas yang dapat memberikan efek. Untuk dapat meningkatkan efikasi dan efek terapeutik, natrium diklofenak dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan transdermal.

Transfersom merupakan agregat kompleks yang meningkatkan ukuran pori hidrofilik kulit sehingga dapat melalui *Stratum corneum* yang merupakan penghalang obat untuk masuk ke dalam kulit. Transfersom mengatasi kesulitan penetrasi kulit dengan memeras diri di sepanjang lipatan penyegelan intraseluler dari stratum korneum. Aktivator tepi adalah komponen transfersom sebagai pelembut bilayer, meningkatkan fleksibilitas dan permeabilitas bilayer lipid. Surfaktan secara proporsional meningkatkan fluiditas membran dan meningkatkan penetrasi melalui kulit. Tween 80 dan Span 80 adalah kedua jenis surfaktan non-ionik yang dapat menembus dengan cepat dan mencapai lebih dalam dari lapisan stratum korneum [6][7].

Natrium diklofenak bersifat sedikit hidrofilik sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian pengaruh tween-80 yang bersifat hidrofilik sebagai *Edge activator* transfersom natrium diklofenak terhadap karakteristik dan laju difusinya.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium, yaitu untuk memformulasikan vesikel transfersom natrium diklofenak sebagai sistem penghantaran transdermal dan uji laju difusi menggunakan sel difusi *Franz*.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu *eppendorf*, gelas beker, gelas ukur, hot plate, *hitter*, pengaduk magnetik (*Biosan*), mikro pipet (*Eppendorf research plus, Germany*), mikroskop digital (*Dino lite*), neraca analitik, particle size analyser (*Delsatm nano c, Beckman Coulter*), pipet tetes, sel difusi *franz*, setrifuse, sonikator, spektrofotometer uv-vis (*Perkin-elmer, Singapore*), *stirrer*, syringe 5ml (*Terumo corp, Philipina*), termometer, timbangan analitik (*A&D Company*), ultrasonikasi, ultrasentrifugasi (*Centurion scientific c2 series, Uk*), vial. Bahan yang digunakan yaitu aquades, fosfatidilkolin, kalium dihidrogen fosfat, natrium hidroksida, natrium diklofenak, tween 80.

Pembuatan Transfersom Natrium Diklofenak

Transfersom dibuat dengan mencampurkan fosfatidilkolin dan tween-80 dalam dapar fosfat pH 7.4. Natrium Diklofenak ditambahkan setelah diperoleh suspensi lipid. Setelah itu dilakukan pengadukan konstan 500 rpm selama 5 menit lalu disonikasi selama 30 menit [8].

Pengamatan Bentuk Morfologi Vesikel

Suspensi transfersom diletakkan di atas permukaan kaca objek. Bentuk dan ukuran vesikel diamati dengan menggunakan mikroskop optik [9].

Pengukuran Efisiensi Penjerapan

Efisiensi penjerapan ditentukan dengan mengukur konsentrasi obat bebas yang tidak terikat dalam media air. Sejumlah transferom ditempatkan dalam tabung *eppendorf* dan disentrifugasi 6.000 rpm selama 30 menit. Diambil supernatan lalu diukur kadar menggunakan spektrofotometer uv-vis pada panjang gelombang 277 nm. Efisiensi penjerapan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$%EE = \frac{Q_t - Q_s}{Q_t} \times 100\%$$

Penentuan Ukuran Partikel

Penentuan ukuran partikel dilakukan dengan menggunakan PSA (*Particle Size Analyzer*). Metode ini dilakukan berdasarkan difraksi sinar laser ukuran partikel dari ukuran submikron sampai millimeter, fluktuasi atau hamburan intensitas cahaya oleh pergerakan partikel yang terdifusi atau tersebar [10].

Uji Laju Difusi Transfersom Natrium Diklofenak secara *In Vitro*

Uji laju difusi dilakukan dengan menggunakan membran kulit ular yang telah dihidrasi selama 30 menit. Kemudian, kompartemen reseptor diisi dengan dapar fosfat pH 7,4 dan dijaga suhu $37 \pm 1^\circ \text{C}$, serta diaduk dengan *stirrer* berkecepatan konstan. Kemudian kulit ular diletakkan di antara kompartemen donor dan kompartemen reseptor dengan posisi stratum korneum menghadap ke atas. 1 mL suspensi transfersom diaplikasikan pada permukaan kulit. Kemudian, pada menit ke 30, 60, 90, dan 120 dilakukan sampling sebanyak 3 mL dan digantikan dengan sejumlah volume yang sama. Sampel diukur serapannya pada panjang gelombang 277 nm dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

Analisis Data

Data hubungan antara masing-masing formulasi dengan presentasi natrium diklofenak terpenetrasi di analisis secara statistik dengan metode One Way ANOVA (*Analysis of Variance*) dengan taraf kepercayaan 99%. Dipilih metode ini karena variabel terikat dan variabel bebas berjumlah satu dimana variabel bebas adalah konsentrasi tween-80 dan variabel terikatnya adalah fluks atau laju difusi.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Morfologi Vesikel Transfersom Natrium Diklofenak

Tabel 2. Bentuk vesikel transfersom natrium diklofenak

Formula	Bentuk
F1	Besar dan kecil; bulat tidak beraturan dan ada yang berbentuk jarum; menumpuk sedikit
F2	Sedang dan kecil; bulat tak beraturan; menumpuk agak banyak
F3	Sedang dan kecil; bulat tak beraturan; menumpuk dan banyak

F4	Besar dan kecil; bulat tak beraturan; menumpuk agak banyak
F5	Sedang dan kecil; bulat tak beraturan; menumpuk sedikit

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kelima formula memiliki bentuk dan jumlah yang berbeda. Dari kelima formula yang memiliki jumlah vesikel terbanyak adalah formula 3.

2. Penentuan Distribusi dan Ukuran Vesikel Transfersom Natrium Diklofenak

Tabel 3. Penentuan distribusi dan ukuran vesikel transfersom

Formula	Indeks Polidispersitas	Ukuran (nm)
F3	0,265	617

Penentuan distribusi dan ukuran dengan *Particle Size Analyzer*. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa distribusi ukuran partikel berdasarkan indeks polidispersitasnya adalah 0.265 sedangkan ukuran partikelnya adalah 617 nm.

3. Penentuan Efisiensi Penjerapan

Tabel 4. Efisiensi penjerapan transfersom natrium diklofenak

Formula	Rasio Perbandingan PC : EA	% Efisiensi Penjerapan
F1	95 : 05	92.83
F2	90 : 10	93.04
F3	85 : 15	93.67
F4	80 : 20	92.36
F5	75 : 25	91.36

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa formula 3 memiliki persentase efisiensi penjerapan tertinggi yaitu 93,67%.

6. Uji Penetrasi Natrium Diklofenak dalam Vesikel Transfersom

Tabel 5. Data hasil rerata jumlah kumulatif terpenetrasi, persen terpenetrasi, dan laju penetrasi (fluks) vesikel transfersom natrium diklofenak

Formula	Jumlah Kumulatif Terpenetrasi ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	Persen Penetrasi (%)	Laju Penetrasi ($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{Jam}$)
F1	27,21	1,09	13,61
F2	33,8	1,35	16,9
F3	73,35	2,93	36,68
F4	38,29	1,49	19,15
F5	28,82	1,15	14,42


Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kumulatif, persen terpenetrasi, dan laju penetrasi tertinggi dimiliki oleh formula 3 dengan jumlah kumulatif terpenetrasi $73,35 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, persen terpenetrasi 2,93% dan laju penetrasi ($36,68 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{Jam}$).

7. Uji One Way-Anova

Hasil uji secara statistik yang didapatkan adalah memenuhi perbedaan yang signifikan dimana nilai p (p Value) kurang dari bias 1% ($\alpha=0.01$) yaitu 0.000, variansi distribusi data yang signifikan yang ditandai dengan nilai sign. lebih besar ($\alpha=0.01$) yaitu 0,097, serta homogenitas data yang juga signifikan yang ditandai dengan nilai sig lebih besar ($\alpha=0.01$) yaitu 0,235.

Pembahasan


Pembuatan kurva baku natrium diklofenak bertujuan untuk mendapatkan persamaan garis yang linear $y = a + bx$ yang berfungsi untuk menghitung jumlah kadar konsentrasi natrium diklofenak didalam sampel. Hasil absorbansi kemudian diregresikan terhadap konsentrasi yang menghasilkan persamaan garis $y = 0.0225x + 0.0019$ dengan nilai korelasi linieritas $r = 0,997$, nilai intersep $a = 0.0019$ dan nilai slop $b = 0.0225$. Kurva pada gambar 1 menunjukkan grafik linear artinya setiap peningkatan nilai konsentrasi diikuti dengan meningkatnya nilai absorbansi.



Gambar 1. Grafik Kurva Baku Natrium Diklofenak dalam Dapar Fosfat pH 7.4

Preparasi transersom dilakukan dengan metode vortex-sonikasi karena sederhana dan cepat dalam pengerjaan. Fosfatidilkolin dan tween-80 dicampurkan lalu dihidrasi dengan dapar fosfat pH 7.4 hingga 10 mL. Hidrasi bertujuan untuk membentuk struktur lamellar yang membentuk bilayer seperti bola. Untuk menghomogenkan cairan yang terbentuk, digunakan pengaduk motor listrik dengan kecepatan 500 rpm selama 5 menit. Kemudian untuk memperkecil ukuran partikel digunakan sonikator selama 30 menit. Energi ultrasonik pada sonikator akan memecah ikatan antar molekul sehingga menghasilkan ukuran vesikel yang lebih kecil [10][12].

Pengujian morfologi vesikel transersom natrium diklofenak dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali. Adanya transersom yang menumpuk ini disebabkan karena fosfatidilkolin tidak hanya membentuk cross link antar partikel dalam satu nanopartikel tetapi juga membentuk cross link antara nanopartikel satu dengan nanopartikel yang lain sehingga nanopartikel saling bergabung membentuk ukuran yang lebih besar [13].




26
(a) (b) (c) (d) (e)

Gambar 2. Bentuk Vesikel Transfersom Natrium Diklofenak (a) Formula 1; (b) Formula 2; (c) Formula 3; (d) Formula 4; (e) Formula 5


13
Penentuan distribusi dan ukuran partikel dilakukan dengan menggunakan PSA atau *Particle Size Analyzer*. Prinsipnya berdasarkan hamburan cahaya laser oleh partikel-partikel dalam sampel. Distribusi ukuran partikel dinyatakan sebagai indeks polidispersitas. Indeks polidispersitas berfungsi untuk menentukan kestabilan fisik suatu sistem dispersi. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa indeks polidispersitas dari formula 3 adalah 0,265. Rentang nilai indeks polidispersitas yang dapat diterima adalah 0 sampai 0,5. Nilai indeks polidispersitas yang rendah menunjukkan bahwa sistem dispersi yang terbentuk bersifat lebih stabil untuk jangka panjang. Ukuran partikel transfersom natrium diklofenak pada formula 3 yaitu 617 nm. Vesikel dengan ukuran tersebut merupakan jenis vesikel LUV (*Large Unilamellar Vesicles*). vesikel LUV adalah vesikel yang memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nm sampai 1000 nm [14].

Berdasarkan kurva pada gambar 3, formula 3 memiliki jumlah kumulatif yang sangat signifikan dibandingkan dengan formula lainnya. Hal tersebut disebabkan karena perbandingan konsentrasi antara fosfatidilkolin dan tween-80 yang proporsional terdapat pada formula 3. Hal ini sesuai dengan Ghada M et al (2010), deformabilitas tergantung pada komposisi *edge activator* yang digunakan. Aktivator tepi adalah komponen pelembut bilayer, seperti surfaktan biokompatibel yang berfungsi meningkatkan fleksibilitas dan permeabilitas bilayer lipid. Konsentrasi tween-80 yang terlalu tinggi dapat menyebabkan transfersom kehilangan struktur vesikelnya karena pembentukan misel yang berlebihan. Sebaliknya konsentrasi tween-80 yang rendah akan menyebabkan pembentukan struktur vesikel yang kaku sehingga sulit untuk terdeformasi dan menyesuaikan dengan ukuran dari *lipid barrier* stratum korneum. [6][15].


Persen terpenetrasi berbanding lurus dengan jumlah kumulatif. Semakin tinggi jumlah kumulatif maka semakin tinggi pula persen terpenetrasi. Berdasarkan kurva pada gambar 4 dapat dilihat bahwa persen terpenetrasi tertinggi dimiliki oleh formula 3.



Gambar 3. Kurva jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terpenetrasi



Gambar 4. Kurva persen natrium diklofenak yang terpenetrasi



Gambar 5. Kurva laju penetrasi transersom natrium diklofenak

Berdasarkan hasil analisis One Way - Anova dapat diamati nilai P atau sig. sebesar 0.000 dengan nilai $\alpha=0.01$, hal ini menunjukkan bahwa nilai P lebih rendah dibandingkan dengan nilai α (H_0 ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi tween-80 sebagai *edge activator* dalam transersom natrium diklofenak dapat berpengaruh pada laju penetrasinya.

4. Kesimpulan

Terdapat pengaruh konsentrasi tween-80 sebagai *edge activator* terhadap karakteristik transersom natrium diklofenak meliputi morfologi vesikel, ukuran partikel dan efisiensi penyerapan. Konsentrasi tween-80 sebagai *edge activator* dapat mempengaruhi laju difusi transersom natrium diklofenak.

Referensi

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ung.ac.id Internet Source	3%
2	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
3	journal.uii.ac.id Internet Source	1%
4	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	1%
5	ojs.uho.ac.id Internet Source	1%
6	id.scribd.com Internet Source	1%
7	adoc.pub Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%

10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
11	ejournal.stfi.ac.id Internet Source	1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
15	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
17	Nurlansi Nurlansi, Ardiansyah Ardiansyah, Rustam Musta. "Waktu Optimum Hidrolisis Pati Limbah Hasil Olahan Ubi Kayu (<i>Manihot esculenta</i> Crantz var. Lahumbu) Menjadi Gula Cair Menggunakan Enzim α -Amilase Dan Glukoamilase", <i>Indo. J. Chem. Res.</i> , 2018 Publication	<1 %
18	Yenni Sri Wahyuni, Erjon Erjon, Reza Aftarida. "PENGARUH SUHU PENYIMPANAN TERHADAP STABILITAS KLINDAMISIN FOSFAT DALAM SEDIAAN EMULGEL DENGAN	<1 %

HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE (HPMC)
SEBAGAI GELLING AGENT", Journal of
Pharmaceutical And Sciences, 2019

Publication

19	core.ac.uk Internet Source	<1 %
20	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
21	media.neliti.com Internet Source	<1 %
22	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository2.unw.ac.id Internet Source	<1 %
24	Hajimi Hajimi, Salbiah Salbiah, Susilawati Susilawati. "Penggunaan Serat Kelapa untuk Pengolahan Limbah Cair Domestik", JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan, 2020 Publication	<1 %
25	berbagaialat.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	es.scribd.com Internet Source	<1 %
27	idoc.pub Internet Source	<1 %

28 journal.ugm.ac.id <1 %
Internet Source

29 pt.scribd.com <1 %
Internet Source

30 repository.uinjkt.ac.id <1 %
Internet Source

31 repository.usd.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

gebe

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
