

sidro 2

by MustapaMustapa

Submission date: 02-Mar-2021 09:30PM (UTC+0900)

Submission ID: 1490470584

File name: turnitin.docx (46.59K)

Word count: 2009

Character count: 12814

EFEK WAKTU HENTI PENDARAHAN (*BLEEDING TIME*) DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides L.*) PADA MENCIT (*Mus musculus*)

ABSTRAK

Bandotan (*Ageratum conyzoides L.*) merupakan tanaman yang berfungsi sebagai agen hemostatik eksternal *Bleeding time* merupakan waktu saat mulai terjadinya perdarahan hingga terbentuk sumbat trombosit dan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga darah berhenti mengalir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan konsentrasi ekstrak etanol daun bandotan (*Ageratum conyzoides L.*) dalam menghentikan pendarahan pada mencit jantan dengan menggunakan penelitian eksperimental. Metode yang digunakan adalah *Metode Duke*. Ekstraksi daun bandotan dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% kemudian diuji skrining fitokimia. Hasil skrining menyatakan positif mengandung flavonoid dan tannin. Hewan uji yang digunakan sebanyak 25 ekor mencit, dibagi dalam 5 kelompok. Kelompok 1 diberi Aquadest, Kelompok 2 diberi obat *Epinefrin* 1mg/1ml, Kelompok 3 diberikan ekstrak etanol daun bandotan 10%, Kelompok 4 diberikan ekstrak etanol daun bandotan 20%, dan kelompok 5 diberikan ekstrak etanol daun bandotan 40%. Data dianalisis dengan uji statistik ANNOVA ($p < 0,01$) Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan waktu henti pendarahan dari setiap kelompok perlakuan dan dilanjutkan dengan uji LSD (*Least Significant Different*). Konsentrasi ekstrak daun bandotan yang memiliki efektivitas dalam menghentikan pendarahan terbaik adalah konsentrasi 40%.

Kata Kunci: *Ageratum conyzoides L.*, Waktu Henti Pendarahan

ABSTRACT

Ageratum conyzoides L. is a plant that functions as an external hemostatic agent. Bleeding time is the time when bleeding begins to form a platelet plug and vasoconstriction of blood vessels so that blood stops flowing. This study aims to determine the effectiveness and concentration of the ethanol extract of *Ageratum conyzoides L.* leaves in stopping bleeding on male mice through an experimental research. The method employed was the Duke Method. *Ageratum conyzoides L.* leaf extraction was carried out by maceration using 96% ethanol solvent then tested by phytochemical screening. The screening result was tested positive for flavonoids and tannins. The tested animals used were 25 mice which were divided into five groups. Group 1 was given aquadest, group 2, 1 mg / 1 ml of epinephrine drug, group 3, 10% ethanol extract of *Ageratum conyzoides* leaves, group 4, 20% *Ageratum conyzoides* leaf ethanol extract, and group 5 was given 40% ethanol extract. Then the data were analyzed using the ANNOVA statistical test ($p < 0.01$). The results of the analysis showed a significant difference in the bleeding stop time of each treatment group and continued with the LSD (*Least Significant Different*) test. The best concentration of *Ageratum conyzoides* leaf extract that has the best effectiveness in stopping bleeding was a concentration of 40%.

Copyright © 2021|jsscr. All rights reserved

Keywords: *Ageratum conyzoides L.*; Bleeding Stop Time

1. Pendahuluan

Ramuan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sudah sejak lama diciptakan oleh nenek moyang kita guna meningkatkan kesehatan hidup dan mengobati penyakit. Naskah kuno yang tersebar diseluruh Indonesia menulis tradisi-tradisi tersebut. Diantaranya terdapat beberapa jenis ramuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang menyerang masyarakat.

Pengobatan herbal masih menjadi pilihan utama baik dinegara maju dan dinegara berkembang, menurut *World Health Organization* (WHO) sebanyak 80% penduduk dinegara berkembang dan 65% penduduk dinegara maju memilih menggunakan obat tradisional [1]. Sebanyak 40% penduduk indonesia menggunakan obat tradisional dan sebanyak 70% berada didaerah pedesaan [2]. Salah satu pemanfaatan obat herbal yaitu dalam menghentikan perdarahan.

Kehidupan organisme dipengaruhi oleh berfungsi normalnya sistem penghentian darah, karena luka dengan ukuran yang kecil pun akan mudah mengalami pendarahan yang parah apabila sistem penghentian darah mengalami gangguan atau terganggu [3]. Ketika permukaan tubuh mengalami luka, tubuh akan mengeluarkan darah, tubuh yang normal ketika mengalami luka setelah beberapa saat darah akan berhenti mengalir, sedangkan pada luka yang besar dapat menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga mengakibatkan kekurangan darah bahkan sampai menyebabkan kematian, maka harus sesegera mungkin melakukan penghentian pendarahan. Tubuh mempunyai sistem untuk menyumbat dan memperbaiki sistem sirkulasi, salah satunya adalah melalui hemostatis. Hemostatis merupakan proses penghentian pendarahan pada pembuluh darah yang cedera [4].

Pada lingkungan pertanian, tanaman bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) disebut sebagai gulma pembawa virus yang sulit dikendalikan perkembangannya. Tanaman bandotan sering dibuang bahkan dibakar karena dianggap dapat menyebabkan tanaman lain pada suatu daerah itu berkurang. Tetapi tanaman bandotan yang sering disebut sebagai tanaman gulma ini menyimpan berbagai manfaat, salah satunya tanaman ini dapat dijadikan sebagai obat untuk luka dengan menghambat pendarahan atau menghentikan pendarahan. Bandotan merupakan tanaman yang berfungsi sebagai agen hemostatik eksternal [5].

Berdasarkan hasil skrining fitokimia, daun bandotan memiliki senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid dan tannin [6]. Tanin bekerja melalui efek astringennya [7]. Selain tanin, flavonoid juga terkandung dalam tanaman bandotan yang dapat memberikan efek sebagai agen hemostatis. Flavonoid berefek dengan cara vasokonstriksi dalam menghentikan pendarahan dan Flavonoid yang dinyatakan sebagai quersetin dapat meningkatkan jumlah trombosit yang fungsinya sangat penting dalam tubuh yaitu menghentikan perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah [8].

Berdasarkan uraian tentang efektifitas daun bandotan dalam menghentikan perdarahan tersebut serta didukung dengan pengalaman empiris dari masyarakat, Peneliti bermaksud untuk melihat efektivitas daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) dalam menghentikan pendarahan (*Bleeding time*) yang diujikan pada mencit jantan (*Mus musculus*) yang dijadikan sebagai hewan uji.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode experimental yang merupakan penelitian laboratorium untuk melihat efektivitas dari ekstrak Daun Bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) dalam menghentikan pendarahan (*Bleeding Time*) yang diujikan pada mencit jantan (*Mus musculus*).

2.1. Parameter Penelitian

Parameter penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Metode Duke*. *Metode Duke* merupakan metode penelitian yang melihat aspek luka bakar pada hewan uji dengan perhitungan waktu perdarahan. Prinsip kerja yaitu perhitungan waktu perdarahan yang dimulai keluar hingga darah tidak dapat terserap dikertas serap. Dalam 30 detik darah diserap dengan kertas serap yang dicatat. Nilai rujukan *Metode Duke* yaitu 1-3 menit [9].

2.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat maserasi, batang pengaduk, gelas kimia, gelas ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, neraca analitik, stopwatch, *Surgical Scissors*.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquadest, etanol 96%, sampel daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.), kertas saring, kertas serap, epinefrin 1:1000, makanan dan minuman hewan uji (pelet, jagung, mentimun dan air putih).

2.3 Prosedur Penelitian

a. Pengolahan Sampel

Sampel daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) dipanen pada pagi hari saat tumbuhan masih segar, kemudian dilakukan sortasi basah dan pencucian menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada daun bandotan, kemudian sampel dikeringkan tetapi tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Selanjutnya dilakukan sortasi kering untuk memisahkan dari daun yang rusak selama pengeringan. Langkah terakhir yaitu daun bandotan yang telah disortasi kering kemudian dibuat dalam bentuk serbuk.

b. Pembuatan Ekstrak

Simplisia daun bandotan dilakukan dengan cara maserasi. Setelah simplisia kering selanjutnya dihaluskan dengan blender. Selanjutnya simplisia ditimbang sebanyak 500 gram kemudian diekstraksi dengan etanol 96% sebanyak 3750 ml dengan wadah toples, selanjutnya ditutup aluminium foil. Proses pendiaman selama lima hari sesekali diaduk. Selanjutnya disaring diperoleh filtrat dan dipekatkan dengan *rotary vacuum evaporator* sampai didapatkan ekstrak kental untuk dihitung persen rendamennya.

2.4 Uji Skrining Fitokimia

Hasil ekstrak etanol daun bandotan kemudian diuji skrining fitokimia untuk mengidentifikasi adanya kandungan senyawa flavonoid dan tannin pada sampel tersebut

a. Uji Flavonoid

Sebanyak 1 gram ekstrak daun bandotan dilarutkan kedalam 2 ml etanol, kemudian ditambahkan serbuk Mg dan HCl pekat sebanyak 5 tetes. Adanya senyawa flavonoid ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah atau jingga.

b. Uji Tannin

Sebanyak 1 gram ekstrak daun bandotan dimasukkan kedalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan FeCl₃ 1% sebanyak 2-3 tetes. Sampel positif mengandung tannin bila mengalami perubahan warna menjadi hijau kehitaman.

2.4 Pengujian Bleeding Time

Hewan uji yang digunakan adalah Mencit berumur 2-3 bulan, dengan berat badan 20-30 gram. Penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Federer yaitu $(n-1)(t-1) \geq 15$. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 ekor mencit jantan (*Mus musculus*). Hewan uji dikelompokkan menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit yaitu kelompok 1 (kontrol negatif diberikan aquadest), kelompok 2 sebagai kontrol positif diberikan epinefrin 1:1000 (1mg/1ml), kelompok 3 (perlakuan 1 ekstrak dengan konsentrasi 10%), kelompok 4 (perlakuan 2 ekstrak dengan konsentrasi 20%) dan kelompok 5 (perlakuan 3 ekstrak dengan konsentrasi 40%).

Selanjutnya ekor mencit diberi tanda sepanjang 2 cm dari ujung ekor. Ekor mencit dianestesi secara topikal menggunakan *ethyl chlorida* disekitar ekor yang akan dilukai. Selanjutnya ekor mencit dipotong sepanjang 3 mm menggunakan *surgical scissor*. Setelah dipotong, ekor mencit dicelupkan kedalam masing-masing kelompok perlakuan selama 5 detik. Setiap darah yang keluar dari ekor mencit diteteskan dikertas serap (tanpa menyentuh luka) setiap 30 detik sampai darah berhenti [10].

3. Hasil dan Pembahasan.

3.1 Ekstaksi dan Penelusuran senyawa Fitokimia

Proses ekstraksi daun Bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) sebesar 11,01% presentase ini menunjukkan bahwa proses penyarian berlangsung baik, presentase rendamen dapat dikatakan sempurna jika hasilnya berkisar 10-15% [11].

Senyawa	Pereaksi	Hasil Uji	Keterangan
Flavonoid	Mg + HCl Pekat	Merah	Positif Flavonoid (+)
Tannin	FeCl ₃	Hijau Kehitaman	Positif Tanin(+)

Berdasarkan hasil skiring fitokimia menunjukkan sampel daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) positif mengandung senyawa Flavonoid (tabel 1). Hal ini sesuai dengan penelitian lain yang melaporkan bahwa dalam daun bandotan mengandung zat akif berupa flavonoid dan tannin [6].

3.2 Pengukuran Bleeding Time

Bleeding time menunjukkan hasil pengukuran rata-rata lama waktu henti pendarahan pada mencit jantan yang dibagi menjadi lima kelompok. Penelitian ini menggunakan parameter metode *duke* dengan nilai rujukan yaitu 1-3 menit. Trombosit adalah faktor besar dalam proses hemostatis. Dibutuhkan sekitar 60 detik hingga helai fibrin mulai seling diantara luka, sehingga setelah beberapa menit (sesuai standarnya) sumbat trombosit sepenuhnya terbentuk, tingkat perdarahan dilihat dari faktor pembekuan dalam darah. Faktor pembekuan darah semakin sedikit maka akan sulit. Begitupun sebaliknya akan mengganggu sirkulasi pembekuan darah jika terlalu banyak, kondisi ini disebut dengan darah kental. Salah satu pemeriksaan masa perdarahan adalah dengan proses *bleeding time* [12]. Adapun hasil pengukuran ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Waktu Henti Pendarahan Pada Luka Ekor Mencit

Kelompok Perlakuan	Waktu Henti Pendarahan (<i>Bleeding time</i>) (Detik)					Σ (detik)	Rata-Rata (detik)
	1	2	3	4	5		
Kelompok 1	207	220	198	194	236	1.055	210
Kelompok 2	68	73	78	77	89	385	77
Kelompok 3	150	140	146	178	154	768	153
Kelompok 4	120	120	115	112	123	590	118
Kelompok 5	90	96	93	90	98	467	93

Keterangan :

- Kelompok 1 : Diberikan aquadest (kontrol negatif) v/v
Kelompok 2 : Diberikan Epinefrin 1ml/1mg (kontrol positif) v/v
Kelompok 3 : Diberikan ekstrak etanol daun bandotan 10% v/v.
Kelompok 4 : Diberikan ekstrak etanol daun bandotan 20% v/v.
Kelompok 5 : Diberikan ekstrak etanol daunbandotan 40% v/v
 Σ : Jumlah

Hasil pengukuran didapatkan yaitu kelompok 2 (kontrol positif) memiliki kemampuan menghentikan pendarahan lebih cepat dibandingkan dengan kelompok perlakuan lainnya. Pemberian Epinefrin berfungsi sebagai zat hemostatik. Berdasarkan golongan obat hemostatik, epinefrin merupakan golongan obat hemostatik lokal kelompok vasokonstriktor dan dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan perdarahan kapiler pada suatu permukaan dengan dosis 1:1000 (1mg/1ml) [13]. Epinefrin ini bekerja pada reseptor adrenergic α_1 untuk menimbulkan efek vasokonstriktor pembuluh darah kapiler kulit dengan cara mengurangi ukuran kapiler darah sehingga suplai darah terbatas dan akibatnya akan mengurangi perdarahan dan rembesan cairan [14].

Berdasarkan data hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 2, ketiga konsentrasi ekstrak etanol daun bandotan memberikan efek dalam menghentikan pendarahan karena masuk dalam range nilai rujukan metode duke yaitu 1-3 menit. Hal ini karena pada daun bandotan mengandung senyawa flavonoid dan tannin yang berperan penting dalam proses hemostatis. Senyawa utama yang dapat berefek sebagai hemostatis adalah tannin dan flavonoid [15].

Hasil uji *One Way Anova* pada penelitian ini menunjukkan hasil sig=0.000 yang berarti ada perbedaan signifikan karena Probabilitas yang dihasilkan kurang dari 0,01 ($P<0,01$). Dari hasil uji *One Way Anova* dapat ditentukan bahwa hipotesis H1 peneliti diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) mampu mempengaruhi waktu penghentian pendarahan (*Bleeding time*) pada mencit jantan. Pada hasil uji dengan menggunakan Uji *Least Significant Difference* (LSD) didapatkan hasil bahwa konsentrasi 40% memiliki efektivitas terbaik dalam menghentikan pendarahan. Berdasarkan hasil analisis data, konsentrasi ekstrak daun bandotan 40% dengan kelompok kontrol positif yang diberikan obat epinefrin mempunyai efek yang sebanding dalam menghentikan pendarahan, meskipun rata-rata

waktu menghentikan pendarahan oleh kelompok kontrol positif lebih cepat dari rata-rata waktu kelompok ekstrak 40%.

4. Kesimpulan

Pemberian ekstrak daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) memiliki efektivitas dalam menghentikan pendarahan pada mencit jantan (*Mus musculus*) yang diamati dari penurunan waktu pendarahan setelah perlakuan. Ekstrak daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) memiliki efektivitas dalam menghentikan pendarahan pada mencit jantan dengan konsentrasi terbaik adalah 40%.

Referensi